

Profylactisch anticoagulatiebeleid bij gehospitaliseerde COVID-19 patiënten		
Type COVID-patiënt	Anticoagulatiebeleid	Voorwaarden
ICU opname	Clexane 1 mg/kg, verspreid over 2 giften Minstens 2 x 40 mg per dag (8 uur en 20 uur) Dus: 100 kg : advies Clexane 2x60 mg 80 kg: advies Clexane 2x40 mg	Bloedplaatjes > 50.000 Geen actieve bloeding Dagelijks anti-Xa bepaling bloedname 4h
Non-ICU opname	Clexane 0,5 mg/kg, in 1 gift Minstens Clexane 40 mg per dag Dus: 100 kg : advies Clexane 1x60 mg 80 kg: advies Clexane 1x40 mg	Bloedplaatjes > 50.000 Geen actieve bloeding Dagelijks anti-Xa bepaling bloedname 4h
ICU CrCl < 30	Clexane 0,5 mg/kg, in 1 gift Minstens Clexane 40 mg per dag Dus: 100 kg : advies Clexane 1x60 mg 80 kg: advies Clexane 1x40 mg	Bloedplaatjes > 50.000 Geen actieve bloeding Dagelijks anti-Xa bepaling bloedname 4h
Non-ICU CrCl < 30	Clexane 0,5 mg/kg, in 1 gift Minstens Clexane 40 mg per dag Dus: 100 kg : advies Clexane 1x60 mg 80 kg: advies Clexane 1x40 mg	Bloedplaatjes > 50.000 Geen actieve bloeding Dagelijks anti-Xa bepaling bloedname 4h

Zo blijvend oplopende d-dimeren onder ingestelde therapie, overwegen Clexane dosis te verhogen (obv anti-Xa meting): overleg mogelijk met dienst bloedings- en vaatziekten. Dit schema is enkel geldig voor profylactische anticoagatiemoed (niet bij indicaties zoals voorkamerfibrillatie, nieuwe trombus, mechanische kunstkleppen etc).